



## Informacija pacientui apie endoskopinį kolonoskopijos tyrimą

Kolonoskopijos tyrimo metu gydytojas endoskopuotojas specialiu lanksčiu endoskopu apžiūri visą storąjį žarnyną.

Kolonoskopija – endoskopinis storosios žarnos ligų diagnostikos ir gydymo būdas.

Indikacijos kolonoskopijai:

1. Veiksmingas storosios žarnos (kolorektalinio) vėžio patikros metodas besimptomiams ir rizikos grupės asmenims. Besimptomių ir neturinčių rizikos veiksnių asmenų kolorektalinio vėžio patikra turėtų būti atliekama nuo 50 metų.
2. Diagnostikos metodas storosios žarnos patologijai nustatyti.
3. Gydymo metodas, kuriuo šalinami polipai, stabdomas ūminis apatinės virškinamojo trakto dalies kraujavimas, pažymimas navikas ir kita.

Kraujas išmatose – viena indikacijų atlikti kolonoskopiją. Kraujavimas gali būti hemorojaus, divertikuliozės, uždegiminių storąjo žarnyno ligų (pvz., Crohno ligos, opinio kolito), vėžio ar polipų požymis.

### Pasiruošimas kolonoskopijos tyrimui



1. **Pacientus, sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis**, pvz., cukriniu diabetu, hipertontaine liga, širdies ritmo sutrikimu ir kt., prieš procedūrą  **turi apžiūrėti bendrosios praktikos gydytojas**. Gydytojo siuntime (F027 /a) turi būti nurodyta pagrindinė, gretutinės ligos ir taikomas gydymas.



2. Prieš tyrimą su nejautra pacientams atliekama: **elektrokardiograma, bendrasis kraujo tyrimas, nustatomas gliukozės kiekis kraujyje, daromi kiti tyrimai pagal indikacijas**.



3. Visą dieną prieš tyrimą pacientas  **turi nieko nevalgyti**, gerti tik skaidrius skysčius (vandeniu, mineralinis vanduo, sultinys) ir išgerti „Picoprep“: 2 kartus po 1 stiklinę, kiekvieną užgeriant 2 litrais skaidraus skysčio, arba 4 litrus „Fortrans“ tirpalo: 4 pakelius vaistų ištirpinant 4 litruose vandens. Šį tirpalą reikia

išgerti per 4-5 val. Žarnyno išvalymui gali būti vartojami ir kiti tam tinkami vaistai (**Eziolen, Moviprep**). Vaistai yra receptiniai, todėl būtinas gydytojo paskyrimas.



4. **Tyrimo dieną pacientas turi būti nevalgęs ir negėręs.** Jei dėl lėtinės ligos pacientui būtina gerti vaistus, tyrimo dienos rytą juos galima užgerti vienu gurkšniu vandens. Jei tyrimas atliekamas ryte (8-12 val.), paruošimui skirtus vaistus reikia išgerti išvakarėse nuo 18 iki 24 val. Jei tyrimas atliekamas po pietų (13-17 val.), 1 dozę vaistų reikia išgerti tyrimo dieną anksti ryte. Nuo rytinės vaistų dozės iki tyrimo turi praeiti ne mažiau kaip 6 valandos.



5. Tyrimas atliekamas taikant bendrąją narkozę: į veną suleidžiama vaistų, pacientas užmiega ir nepatiria jokių nemalonių pojūčių.



6. Kolonoskopijos tyrimo dieną pacientas Medicinos diagnostikos ir gydymo centre praleidžia 2-3 val. Tyrimas trunka nuo 15 min. iki 1 val., po jo pacientas dar kurį laiką miega. Kadangi kolonoskopija atliekama taikant bendrąją narkozę, reikėtų atvykti su lydinčiu asmeniu, nes **po tyrimo negalima vairuoti automobilio.**



## Maitinimosi rekomendacijos ruošiantis kolonoskopijai

### 2-3 dienos iki procedūros

(pvz., jei tyrimas bus pirmadienį, pradėkite ruoštis penktadienį)



#### Negalima vartoti:

- sėklų,
- riešutų,
- grūdų ir kruopų,
- raudonos/ violetinės spalvos maisto ir gėrimų,
- ne baltos spalvos maisto produktų,
- vaisių ir daržovių

Gydytojo rekomendacija .....



#### Galima vartoti:

- pieną, natūralų jogurtą be priedų, varškę, majonezą be prieskoninių žolelių, grietinę, grietinėlę, sviestą,
- baltą duoną, baltuosius ryžius, aukščiausios rūšies makaronus, aukščiausios rūšies kvietinius miltus,
- bulves be lupenų,
- vištienos krūtinėlę be odos, baltos žuvies filė be odos, kiaušinius,
- sūrį be priedų (be kmylių, be žolelių),
- baltą šokoladą be priedų, vanilinius ledus, cukrų.

## 1 diena iki procedūros

(pvz., jei tyrimas bus pirmadienį, tai nuo sekmadienio)



- Nevalgykite nieko arba suvalgykite lengvus pusryčius (pvz., virtą kiaušinį su baltos duonos riekele arba lėkštelę ryžių) iki 9 val. ryto.
- Skaidrių skysčių galima vartoti be apribojimų.



### Negalima vartoti:

- alkoholinių gėrimų,
- pieno ir jo produktų,
- glotnučių,
- neskaidrių sulčių (apelsinų, pomidorų, multivitaminų, greipfrutų ir kt.), sriubos,
- raudonos/ violetinės spalvos gėrimų, ledinukų ar želė.



### Galima vartoti:

- vandenį,
- arbatą, kavą be grietinėlės ar pieno,
- skaidrius gaiviuosius gėrimus (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos),
- obuolių sultis,
- sultinį be tirščių,
- ledinukus be priedų (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos)
- želė be priedų (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos)



## Svarbu!

### Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei 1–2 parą po kolonoskopijos tyrimo:

- staiga atsiranda stiprus pilvo skausmas, išpila šaltas prakaitas, pykina, vemiate;
- pakyla temperatūra virš 37,5 °C, krečia šaltis;
- pasidaro silpna, alpstate, gausiai tuštinatės su krauju ar krešuliais.

### Medicinos diagnostikos ir gydymo centras



V. Grybo g. 32, Vilnius



Registracija tel. +370 698 0000



[www.medcentras.lt](http://www.medcentras.lt)

I-V 7.00-20.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.

VI 8.00-15.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.

VII 9.00-15.00 val. Atliekami tik MRT tyrimai!



Paskutinis tyrimas atliekamas likus 30 min. iki darbo pabaigos.